

Dr. med. A. Schwarz
Facharzt für Kinder- und
Jugendmedizin
Neuropädiatrie Psychotherapie

Vaihinger Str. 8
71665 Vaihingen/Enz
Tel. 07042/4026
Fax 07042/4044

Fructoseintoleranz-Test

Fruchtzucker (2 – 3 Std. Dauer)

2-3 Tage vor der Untersuchung:

- Kein Obst, kein Gemüse, kein Salat, sowie keine Fruchtsäfte, Vorsicht bei Süßigkeiten (z.B. Fruchtgummibären) Fruchtteis
- Keine Müslimischungen oder Fertiggerichte, die Fruktose enthalten können

Am Untersuchungstag: Beginn 8 Uhr

- Zähne können mit einer handelsüblichen Zahnpasta geputzt werden
- Ein Glas möglichst heißes Wasser trinken, sonst nüchtern

Vorgehensweise:

- pusten
- Tee trinken (einmal)
- alle 30 Minuten pusten (wie Luftballon aufblasen).

Nach den derzeit geltenden Bestimmungen kann die Durchführung eines Fructose-Intoleranz-Testes in einer kinder- und jugendärztlichen Praxis nicht über die Kassenärztliche Vereinigung abgerechnet werden, deshalb stellen wir Ihnen die Durchführung des Testes mit einem Betrag von

35,78 Euro

(GOÄ) in Rechnung. Wird der Fructose-Intoleranz-Test in einem Krankenhaus durchgeführt, ist er dort als kassenärztliche Leistung abrechenbar.