

Dr. med. A. Schwarz
Facharzt für Kinder- und
Jugendmedizin
Neuropädiatrie Psychotherapie

Vaihinger Str. 8
71665 Vaihingen/Enz
Tel. 07042/4026
Fax 07042/4044

Lactoseintoleranz-Test

Milchzucker (2 – 3 Std. Dauer)

2 – 3 Tage vor der Untersuchung:

- keine Milch und Milchprodukte essen und trinken
(keine Schokolade, kein Eis, keinen Joghurt und Käse).

Am Untersuchungstag: Beginn 8 Uhr

- nüchtern
- Zähne nicht putzen
- ein Glas möglichst heißes Wasser trinken

Vorgehensweise:

- pusten
- Tee trinken (einmal)
- alle 30 Minuten pusten

Nach den derzeit geltenden Bestimmungen kann die Durchführung eines Lactose-Toleranz-Testes in einer kinder- und jugendärztlichen Praxis nicht über die Kassenärztliche Vereinigung abgerechnet werden, deshalb stellen wir Ihnen die Durchführung des Testes mit einem Betrag von

35,78 Euro

(GOÄ) in Rechnung. Wird der Lactose-Toleranz-Test in einem Krankenhaus durchgeführt, ist er dort als kassenärztliche Leistung abrechenbar.